

Listová hnojiva

| | |
|---|--|
| CAMPOFORT® Fosfamid RETAPOS | Pro úpravu výživného stavu u oz. obilovin a řepky na podzim. Zlepšují jistotu přezimování a jarní regeneraci rostlin. |
| FORTESTIM® - alfa FORTESTIM® - beta FORTESTIM® - gama FORTESTIM® - delta | Mají výrazný stimulační účinek. Zlepšují start rostlin v raných fázích vegetace, zvyšují příjem živin a pomáhají účinně odstranit následky stresu. |
| CAMPOFORT® Garant P CAMPOFORT® Garant K CAMPOFORT® Garant Ca CAMPOFORT® Special B CAMPOFORT® Special Fe CAMPOFORT® Special Mn CAMPOFORT® Special Zn CAMPOFORT® Ultra Ca CAMPOFORT® Plus CAMPOFORT® Forte | Pro úpravu deficitů příslušné živiny. Doporučujeme aplikovat na základě výsledku ARR. |

Přídavková hnojiva

**Hořčík 140
Síra 165
Bór 150**



UREA stabil

Sítovaná močovina s inhibitorem ureázy. Inhibitor ureázy otevírá nové možnosti použití dusíku ve formě močoviny.

| | |
|------------------|--|
| Použití | Základní hnojení jařin, regenerační a produkční hnojení ozimů (aplikace v době vláhové jistoty). |
| Přednosti | <ul style="list-style-type: none">• Vynikající rozpustnost bez nutnosti vydatných srážek• Dobrý prostup profilem ke kořenům rostlin• Přijatelnost i za nízkých teplot. |
| Dávka | Nejvyššího hospodářského efektu se dosahuje při dávkách od 60 kg N/ha výše. |

Stabiluren

Inhibitor ureázy pro kombinaci s hnojivem DAM a SAM. Zvyšuje podíl dobře přístupného dusíku v hnojiu DAM.

| | |
|------------------|--|
| Použití | Základní hnojení jařin, regenerační a produkční hnojení ozimů (aplikace v době vláhové jistoty). Nejvyššího hospodářského efektu se dosahuje při dávkách DAM od 150 l/ha výše. |
| Přednosti | <ul style="list-style-type: none">• Zrychlení prostupu dusíku profilem ke kořenům rostlin• Přijatelnost i za nízkých teplot. |
| Dávka | Cca 0,2l na 100l DAM. |

N-FENOL MIX

Stimulátor na bázi nitrofenolátů.

| | |
|----------------|---|
| Složení | 4-nitrofenolát sodný: 9 g/l 2-nitrofenolát sodný: 6 g/l 5-nitroguajakolát sodný: 3 g/l |
| Použití | Především v porostech řepky v počátku květu. Je možné použití i v dalších plodinách, kde je cílem stimulace porostu. Doporučujeme použít až po odpovídajícím hnojení dusíkem. |
| Dávka | Cca 0,2 l/ha. |