

OligoSTART

ES HNOJIVO – E.2.4.1 Směs stopových živin

NAWÓZ WE – Mieszanka mikrośladników pokarmowych

E.2.4.1

Živina Skład	Hmotnostní % Zawartość	Obsah živin Zawartość	Čistá hmotnost Waga netto	
Měď (Cu) Miedź (Cu)	6%	110 g/l	8,95 Kg	5 L
Mangan (Mn) Mangan (Mn)	18%	330 g/l		
Zinek (Zn) Cynk (Zn)	4,5%	84 g/l		



soufflet
AGRO

CZ

VAROVÁNÍ • H319 Způsobuje vážné podráždění očí. • **H410** Vysoce toxicky pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. • **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. • **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranné čepičky šit. • **P305 + P351 + P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • **P337 + P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/oseťení. • **P391** Uniklý produkt seberte. • **P501** Odstraňte obsah/obal v souladu s místní a národní právní úpravou. Prázdné obaly od přípravku znehodnotte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci. • **EUH208** Obsahuje směs 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE [EC No. 247-500-7] a 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC No. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Koncen-trace max.	Apli-kace	Termín aplikace
Aplikace na list				
obiloviny	1 l/ha	1 %	1x	od 2. listu až do 1. kolény, opakovat v případě potřeby
kukuřice	1–2 l/ha	1 %	1x	od 4. do 8. listu
brambory	1–2 l/ha	1 %	1x	1 aplikace 2–3 týdny po plném vzejtí
zelenina	1–2 l/ha	1 %	1x	při seti od velikosti 15 cm nebo 2 týdny po přesazení

PŘÍPRAVA POSTŘÍKOVÉ JICHY **1** Naplňte postřikovač polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchání. **2** Protřepete kanystr s přípravkem OligoSTART a do stálého míchání doplňte doporučené množství. Přidejte zbývající množství vody. V případě použití tanku mixu přidávejte OligoSTART jako poslední. Nepřestávejte míchat. **3** Po ukončení práci postřikovače důkladně očistěte a omylejte (např. přípravkem KeepGuard).

Pro dosažení rovnoměrného pokrytí porostu použijte dostatečné množství vody. Vyhnete se aplikaci za silného slunečního záření a při vysokých teplotách. Pokud možno provádějte postřik večer nebo brzy ráno a to především v případě, že denní teploty přesahují 28°C. Velmi mladé listy a porost pod stresem může být náchylnější k popálení. V těchto případech aplikujte menší množství přípravku a odpovídajícím způsobem upravte interval aplikace. Používejte pouze venku.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ Používejte pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávky. Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřený, na ochranném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem.

LIKVIDACE Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Vše speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Prázdné obaly nepalce a předejte je do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

Datum výroby: uvedeno na obalu • **Číslo výrobního šarže:** uvedeno na obalu
Výhradní dovozce do ČR: SOUFFLET AGRO a.s.,
 Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, ČR,
 Tel. +420 582 328 320
Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Actiwestre-3 av de l'Orchidée,
 31390 CARBONNE, France

Hustota:
1.79

PL

UWAGA • H319 Działa drażniąco na oczy. • **H410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. • **P102** Chronić przed dziećmi. • **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. • **P305 + P351 + P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • **P337 + P313** W przypadku urazy/rażenia się działaniem drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. • **P391** Zebrać wyciek. • **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do punktów odbioru opakowań w środkach ochrony roślin zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. • **EUH208** zawiera MIESZANINĘ: 5-CHLORO-2-METYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONU [WE NR 247-500-7] i 2-METYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONU [WE NR 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcję alergiczną.

ZALECANA DAWKI

Uprawy	Dávka	Maks. stęże-nie	Apli-kacje	Termin zabiegu
Stosowanie dolistne				
zboża	1 l/ha	1 %	1x	w fazie od 2-go liścia do pierwszego kolanką, zabieg powtórzyć w razie wystąpienia niedoborów
kukurydza	1–2 l/ha	1 %	1x	w fazie od 4-go do 8-go liścia
ziemiaki	1–2 l/ha	1 %	1x	2–3 tygodnie po wschodach i po badaniu tkanki w okresie zawiązywania bulw
warzywa	1–2 l/ha	1 %	1x	oprysk w fazie 15 cm po zasianiu albo 1 oprysk dwa tygodnie po przesadzeniu

ZALECENIA STOSOWANIA **1** Napelnić zbiornik spryskiwacza połową wymaganej ilości wody i włączyć mieszadło. **2** Dobrze wstrząsnąć opakowaniem produktu i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. Uzupelnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając. Przy wykonywaniu mieszanki zbiornikowej produkty o formułach proszkowej powinny być dodane w pierwszej kolejności. **3** Po zakończeniu zabiegu aparaturę dokładnie umyć.

W celu uzyskania optymalnego efektu należy zastosować optymalną ilość wody, która pozwoli na pokrycie całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe zabieg należy wykonać wieczorem lub wczesnie rano, szczególnie, gdy prognozowane są temperatury przekraczające 28°C w ciągu dnia. W przypadku roślin w wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy przyjąć zmniejszone dawki. Dawki i terminy stosowania dla poszczególnych upraw podane są na tej etykiecie w zaleceniach wg upraw. Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu.

OGÓLNE ZALECENIA Nawóz do zastosowania w uprawach, w których stwierdza się niedobór ww. pierwiastków. Nie przekraczać zalecanych dawek. Przechowywać w oryginalnym i szczerze zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

UTYLIZACJA Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikaj uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wyprodukować trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

Data produkcji: na opakowaniu • **Nr partii:** na opakowaniu
Dystrybutor: SOUFFLET AGRO POLSKA SP. Z O. O.,
 ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, Tel. +48 616 501 096
Producer: AGRONUTRITION, Parc Actiwestre-3 av de l'Orchidée,
 31390 CARBONNE, France

Gęstość:
1.79

