



# EsfenGUARD

## INSEKTICID DO OBILNIN A ŘEPKY OZIMÉ

Spolehlivý fotostabilní insekticid ze skupiny pyretroidů. Působí proti savým a žravým škůdcům v řepce oleje a obilnách. Působí na všechna vývojová stadia hmyzu. Chování v rostlinách je nesystemické s částečně translaminárním účinkem.

### PŘEDNOSTI

- ▶ Široké spektrum účinnosti.
- ▶ Spolehlivý i za relativně vyšších teplot, ale ideální účinnost při teplotě 15–22 °C.
- ▶ Nemá omezení na včely.

**Účinná látka:** Esfenvalerát 50 g/l

**Formulace:** EW (emulze typu olej ve vodě)

**Balení:** 1 l, 5 l

### TERMÍN APLIKACE

- ▶ Podle signalizace, od začátku výskytu.
- ▶ Řepka: proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému v BBCH 30–35, proti blyskáčku řepkovému v BBCH 50–55, proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové v BBCH 60–65.
- ▶ Obilniny: proti kohoutkům rodu *Oulema* a mšicím v BBCH 12–62.



Krytonosec čtyřzubý



Bejlomorka kapustová



Larva kohoutka




Mšice

## POUŽITÍ

Plodina	Škodlivý činitel	Dávkování	Aplikace	OL
<b>Pšenice, žito, tritikale, oves, ječmen</b>	kohoutci rodu <i>Oulema</i> , mšice	0,1 l/ha	max. 3x za vegetaci	35
<b>Řepka olejka</b>	krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý	0,1 l/ha	max. 1x za vegetaci	42
<b>Řepka olejka</b>	blýskáček řepkový	0,15 l/ha	max. 1x za vegetaci	42
<b>Řepka olejka</b>	krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová	0,2 l/ha	max. 1x za vegetaci	42

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.



PŠENICE, ŽITO, TRITIKALE, OVES, JEČMEN – KOHOUTCI RODU *OULEMA*, MŠICE

BBCH 12–62

EsfenGUARD 0,1 l



ŘEPKA OLEJKA – KRYTONOSEC ŘEPKOVÝ, KRYTONOSEC ČTYŘZUBÝ

BBCH 30–35

EsfenGUARD 0,1 l

ŘEPKA OLEJKA – BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ

BBCH 50–55

EsfenGUARD 0,15 l

ŘEPKA OLEJKA – KRYTONOSEC ŠEŠULOVÝ, BEJLMORKA KAPUSTOVÁ

BBCH 60–65

EsfenGUARD 0,2 l

## OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI

- ▶ SPE3 Neošetřená ochranná vzdálenost 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- ▶ SPE3 Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku pro ochranu necílových členovců 5–0–0 m.
- ▶ Nemá omezení v PHO II. st.
- ▶ Řepka ozimá max. 1x za vegetaci
- ▶ Obilniny max. 3x za vegetaci.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

## V PŘÍPADĚ NUTNOSTI LZE KOMBINOVAT

- + Multifunkční smáčedlo MultiAD 0,1–0,2 l (pokryvnost, penetrace).
- + Herbicidy.
- + Graminicydy.
- + Insekticidy  
krytonosec stonkový: EsfenGUARD 0,1 l + AcetGUARD 0,1 kg (Ize v čistém DAM 390)  
blýskáček: EsfenGUARD 0,15 l + AcetGUARD 0,1 kg + MultiAD 0,2 l + (Ize v čistém DAM 390)  
kryt. šešulový a bejlmorka kapustová: EsfenGUARD 0,2 l + AcetGUARD 0,1 kg + MultiAD 0,2 l.
- + Fungicidy: pozor, mění se toxicita pro včely.
- + Regulátory: pozor, mění se toxicita pro včely.
- + DAM 390: pozor, mění se toxicita pro včely.
- + Listová hnojiva: pozor, mění se toxicita pro včely.

### Čechy

Jiří Šilha 724 336 184  
Michal Konrady 602 359 904

jsilha@soufflet.com  
mkonrady@soufflet.com

### Morava

Martina Poláková 724 762 609  
Žaneta Hrnčířová 702 188 268  
Tomáš Navrátil 601 101 934

mpolakova@soufflet.com  
zhrncirova@soufflet.com  
tnavratil@soufflet.com