

NitroTOP NG

ES HNOJIVO – kapaln  dusikat  hnojivo

NAW Z WE – Roztw r nawozu azotowego

C.1.1.



�zivina Sk�ad	Hmotnostni % Zawarto�c	Obsah �ivin Zawarto�c	�ist� hmotnost Waga netto	
Dusik (N) celkov� Azot (N) w formie amidowej	23,1 %	300 g/l	12,8 Kg	10 L
Ho�cik (MgO) vodorozpuszt� Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie	2,34 %	30 g/l		
Sira (SO ₃) vodorozpuszt� Siarka (SO ₃) rozpuszczalna w wodzie	4,68 %	60 g/l		



soufflet
aGRO

UPOZORNĚNÍ

- P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místní a národní právní úpravou. Prázdné obaly od přípravku znehodnotte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikace	Termín aplikace
pšenice	15–20 l	1 ×	od objevení se praporcového listu až do konce metání
cukrovka	10–20 l	1–2 ×	1. fáze 4–6 listů 2. 30 dní po první aplikaci
řepka olejka	10–15 l 15–20 l	1–2 ×	1. podzim – fáze 4–8 listů 2. jaro – začátek prodlužovacího růstu až butonizace
slunečnice	10–15 l	1 ×	fáze 5–6 párů listů až fáze hvězdy
kukuřice	15–20 l	1–2 ×	1. fáze 4–6 listů 2. 10–15 dní po první aplikaci
brambory	15–20 l	1 ×	začátek tvorby hlízy až počátek květu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

PŘÍPRAVA POSTŘÍKOVÉ KAPALINY Pro lepší účinnost používejte optimální dávku vody na ha, aby ošetření listů bylo rovnoměrné a zároveň nedocházelo ke stékání postřiku. Doporučená dávka vody je minimálně 100 l/ha. Odměrné množství hnojiva nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Při pravení postřik aplikujte během několika hodin. Doporučujeme ošetřovat při teplotě 6 až 25 °C.

MÍSITELNOST S PESTICIDY A HNOJIVY NitroTOP^{NG} je mísitelný s běžně používanými fungicidy a insekticidy, do směsí jej přimíchávejte až jako poslední. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test mísitelnosti. V případě kombinaci s jinými listovými hnojivy doporučujeme konzultaci s jejich výrobcí.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ Skladujte v originálních a dobře uzavřených obalech při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem, vlhkostí a přímým slunečním svitem.

PRVNÍ POMOC Všeobecné pokyny: projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání: přeřete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. **Při zasažení kůže:** odoďte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. **Při zasažení očí:** při otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetřavávejí-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). **Při náhodném požití:** usta vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu, popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. **Při vyhledání lékařského ošetření:** informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. O případné potřebě lze další postup při první pomoci (i eventuelní následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2**, telefon nepřetržitě: **224 919 293** nebo **224 915 402**.

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu

Výhradní dovozce do ČR: SOUFFLET AGRO a.s.,

Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, Česká republika, tel. +420 582 328 320

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Actives-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France

**OSTRZEŽENIE**

- P102** Chronić przed dziećmi.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Uniknąć uwolnienia do środowiska.
P501 Zawartość/pojemnik usunąć do punktów odbioru opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

ZALECANE DAWKI

Uprawy	Dawka	Aplikacje	Termín zabiegów
Pszenica	15–20 l	1 ×	Od fazy liścia flagowego do fazy kwitnienia
Buraki	10–20 l	1–2 ×	W fazie 4–6 liści i w razie konieczności po upływie miesiąca
Rzepak	10–15 l 15–20 l	1–2 ×	Od fazy 4–8 liści (jesienią) 10–15 l/ha oraz przed kwitnieniem (wiosną)
Stonecznik	10–15 l	1 ×	Od fazy 5–6 par liści do pojawienia się pąka kwiatowego
Kukurydza	15–20 l	1–2 ×	W fazie 4–6 liści i w razie konieczności 10–15 dni później
Ziemniaki	15–20 l	1 ×	Przed zawiązywaniem bulw i na początku kwitnienia

Stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie przekraczać zalecanej dawki.

PRAKTYCZNE RADY DOTYCZĄCE STOSOWANIA Optymalną skuteczność uzyskamy stosując wystarczającą ilość wody, pozwalającą na dokładne pokrycie roślin. Minimalna zalecana ilość wody to 100 l/ha.

SPORZĄDZANIE MIESZANINY ZBIORNIKOWEJ 1 Napełnić ¾ zbiornika wodą potrzebną do oprysku 2 Dodać preparaty np. insektycydy oraz fungicydy 3 Przy włączonym mieszadle, dodawac odmierzoną dawkę NitroTOP^{NG}.

MIESZANIE NitroTop^{NG} można mieszać z większością powszechnie stosowanych insektycydów i fungicydów. W przypadku mieszanki z innymi nawozami dolistnymi zalecany jest kontakt z ich producentami.

PRZECHOWYWANIE Przechowywać w zamkniętych hermetycznie oryginalnych pojemnikach, w temperaturze 5–30 °C. Chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.

PIERWSZA POMOĆ Rady ogólne: w przypadku problemów zdrowotnych lub w razie wątpliwości, poinformować lekarza, podając mu informacje zawarte na etykiecie lub w ulotce. **W przypadku wdychania:** zakończyć kontakt z wdychanym środkiem, zapewnić oddech fizyczny i psychiczny. **W przypadku kontaktu ze skórą:** natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przemyc natychmiast skórę ciepłą wodą z mydłem i obficie spłukać. **Unikać zanieczyszczenia oczu:** zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast obficie wodą przy otwartych powiekach i płukać minimum 15 minut – szczególnie okolicę pod powiekami – myć najlepiej obficie ciepłą bieżącą wodą. Jeśli symptomy utrzymują się (zaczernienie, wrzodzenie porażenia) skonsultować się natychmiast z lekarzem (zastosować leczenie). **W razie przypadkowego spożycia:** przepłukać usta wodą (wyłącznie, jeśli posiłkowaliśmy jest przystojny i nie ma skurczów), nie doprowadzać do wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazując etykietę, ulotkę produktu. **Pomoc medyczna:** w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna nie ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: **Gdańsk (58) 682 04 04; Rzeszów (17) 866 40 25; Kraków (12) 411 99 99; Sosnowiec (32) 266 11 45; Lublin (81) 740 89 83; Tarnów (14) 631 54 09; Łódź (42) 657 99 00; Poznań (61) 847 69 46; Warszawa (22) 619 66 54; Wrocław (71) 343 30 08**

Data produkcji: na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu

Dystrybutor: SOUFFLET AGRO,

POLSKA SP. Z O. O., ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, tel. +48 616 501 096

Producent: AGRONUTRITION, Parc Actives-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France