



AzoGUARD

DLOUHODOBĚ ÚČINNÝ FUNGICID PROTI ŘADĚ VÝZNAMNÝCH CHOROB


Širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů určený k ochraně pšenice a ječmene proti listovým a klasovým chorobám, dále kukuřice, řepky, chřestu a rajčat proti houbovým chorobám.

PŘEDNOSTI

- ▶ Širokospektrální fungicid s dlouhodobým protektivním a kurativním účinkem
- ▶ Brání vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů
- ▶ Ideální partner k azolovým fungicidům
- ▶ Výrazný green efekt – porosty jsou déle zdravé a zelené
- ▶ Podporuje výnos, HTS a podíl předního zrna
- ▶ Účinný proti všem významným listovým chorobám obilnin s vedlejší účinností na padlí a fuzariózu klasu
- ▶ Snižuje výskyt zahnědlých špiček u sladovnického ječmene
- ▶ V řepce má vynikající účinnost proti hlízence a černi řepkové
- ▶ Významná vedlejší účinnost proti plísni šedé a plísni zelné
- ▶ Bez omezení v PHO II. stupně podzemních vod

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l


Formulace: suspenzní koncentrát (SC) pro ředění vodou



braničnatka pšeničná



hnědá skvrnitost



rzi




rhynchosporiová skvrnitost



braničnatka plevová



padlí travní



hlízenka obecná




čern řepková


POUŽITÍ PŘÍPRAVKU A FIREMNÍ DOPORUČENÍ

Plodina	Účinnost	Aplikační dávka, registrovaný počet aplikací	Poznámka
pšenice	braničnatka pšeničná braničnatka plevová rez pšeničná významná vedlejší účinnost: helminthosporioza pšenice padlí travní fuzariózy klasu rez plevová	0,8 l/ha max. 1 ×	Aplikace se provádí před nebo na začátku výskytu chorob. Pro posílení účinnosti a zajištění kurativního efektu doporučujeme kombinaci AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + EpoGUARD 0,4–0,6 l/ha nebo TebuGUARD 0,7 l/ha. Aplikaci je možné provádět od začátku sloupkování až konce kvetení (BBCH 31–69). Časně jarní ošetření provádíme v případě silného infekčního tlaku a stresových podmínkách, současně doplňujeme důležité prvky v přípravku CereaSTART 3 l/ha. Doporučená je aplikace ve fázi praporcového listu až konce metání z důvodu využití specifických předností přípravku, které zabezpečí maximální výnos při optimální kvalitě, dosažení vysokých hodnot N – látek podpoří přidání NitroTOP 10–20 l/ha, bez rizika popálení porostu.
ječmen	rez ječná hnědá skvrnitost ječmene významná vedlejší účinnost: rhynchosporiová skvrnitost padlí travní	0,8 l/ha max. 1 ×	Aplikace se provádí před nebo na začátku výskytu chorob. Pro posílení účinnosti je vhodná kombinace AzoGUARD 0,4–0,5 l/ha + EpoGUARD 0,4–0,6 l/ha nebo TebuGUARD 0,6–0,7 l/ha. Aplikaci je možné provádět od začátku sloupkování až konce metání (BBCH 31–59). Ošetření sladovníkových odrůd se provádí nejčastěji ve fázi začátku sloupkování, na začátku infekčního tlaku chorob. Stimulační efekt přípravku zvyšuje odolnost proti stresu, podporuje rozvoj kořenového systému a dosažení požadovaného počtu produktivních odnoží. Vhodný TM s regulátory růstu MoGUARD 0,2–0,3 l/ha (BBCH 31–39) a hnojivem CereaSTART 3 l/ha, které posiluje dlouhodobě dobrou kondici porostu. V průmyslových oblastech strobilurinové přípravky při aplikaci na praporcový list díky green efektu prodlužují vegetaci, eliminují nebezpečí předčasněho stárnutí pletiv spojeného se sklizní drobného zrna a vysokých N látek.
řepka	hlízenka obecná černí řepková významná vedlejší účinnosti: plíseň šedá a plíseň zelná	1 l/ha max. 1 ×	Proti hlízence a černím ošetřujte na začátku kvetení až začátku opadu prvních okvětních plátků (BBCH 61–69), v případě tlaku šešulových škůdců doporučujeme TM s AcetGUARD 0,15–0,18 kg/ha. Současně doplňujeme důležité mikro a makro prvky v OilSTART Fluid 3–5 l/ha nebo OilTOP 1,5 l/ha, které podporují délku kvetení a omezují opad šešulí.
+ MultiAD 0,1% Organosilikátové smáčedlo nové generace			- Umožňuje snížit spotřebu vody bez snížení účinnosti postřiku. - Podporuje účinnost, smáčlivost, přilnavost a penetraci účinných látek, podporuje kompatibilitu přípravků aplikovaných v tank-mixu. - Optimalizuje velikost kapek na 150–300 µm – redukuje úlet, zlepšuje pokrývnost a zasažení škodlivých organismů. - Zpomaluje vysychání postřikové kapaliny, důležité při teplotě nad 23 °C a nízké vlhkosti vzduchu.
+ SunGUARD 0,75 l/ha Ochranný prostředek proti extrémním teplotám a slunečnímu úžehu			- Vytváří dlouhotrvající ochranný film na listech ošetřených plodin (14 až 21 dní), nezbytná je aplikace s předstihem na základě předpovědi počasí. - Omezuje neproduktivní výpar. - Podporuje dobrou kondici porostu i za extrémních teplot, zajišťuje vysokou hodnotu HTZ a objemové hmotnosti i za sucha.

JEČMEN A PŠENICE



ŘEPKA OZIMÁ



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

Jižní, východní a střední Čechy
Západní a severní Čechy
Východní Čechy a jižní Morava
Střední a severní Morava

Jiří Šilha
Kamil Štípek
Martina Poláková
Žaneta Hrnčířová

724 336 184
602 359 904
724 762 609
702 188 268

jsilha@soufflet.com
kstipek@soufflet.com
mpolakova@soufflet.com
zhrncirova@soufflet.com