



# AcetGUARD

## INSEKTICID SE ŠIROKÝM SPEKTRÉM VYUŽITÍ

Systémový selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů k hubení širokého spektra živočišných škůdců v řepce oleje a bramborách.

### PŘEDNOSTI

- ▶ kontaktní a systémový účinek
- ▶ rychlé a dlouhodobé působení
- ▶ účinkuje na škůdce i v nových přírůstcích
- ▶ podpora výnosu a kvality
- ▶ účinný i při vyšších teplotách
- ▶ bez omezení na včely
- ▶ účinkuje ve velmi nízkých dávkách
- ▶ maximální počet ošetření řepky olejky 3× v průběhu vegetace

**Účinná látka:** acetamiprid 200 g/kg

**Formulace:** ve vodě rozpustný prášek (SP)



Krytonosec řepkový



Bejlomorka larva



Krytonosec čtyřzubý



Krytonosec šešulový



Blýskáček řepkový



Bejlomorka kapustová




Mandelinka bramborová


## POUŽITÍ PŘÍPRAVKU A FIREMNÍ DOPORUČENÍ

Plodina	Škůdce	Dávkování	Poznámka
řepka olejka	Krytonosec řepkový Krytonosec čtyřzubý	0,12 kg/ha, max. 1×	Ošetření se provádí v průběhu března až dubna na základě signalizace. Práh škodlivosti jsou 3 brouci <b>stonkových krytonosců</b> na 1 Mörickeho miskou za 3 dny. Ošetřujeme v době obnovy zeleně až počátkem prodlužování, vždy do 3 dnů po teplotách nad +6 °C zhruba v době květu zlatice ( <i>Forsythia suspensa</i> ). Je možná společná aplikace s druhou dávkou N v DAM 390. Vhodné je současné doplnění bóru přípravky BorSTART 1 l/ha nebo OilSTART 3–5 l/ha, které svým složením podporují rychlou regeneraci porostu.
	Blýskáček řepkový	0,08–0,1 kg/ha, max. 1×	Ošetření při náletu <b>blýskáčka</b> (1 brouk na květenství ještě kryté listy). Vhodná společná aplikace s azolovými fungicidy s morforegulačním účinkem (podpora větvení a omezení poléhání) TebuGUARD 1 l/ha. Při společné aplikaci s fungicidem je nezbytné provádět ošetření až po ukončení letu včel. Současně aplikujeme důležité živiny pro podporu nasazení šešulí - B, S, Mo a Mg v přípravku OilSTART Fluid 3–5 l/ha, obsažené huminové látky zvyšují absorpci živin. Vzhledem ke stavbě těla blýskáčka účinnost velmi efektivně zvyšuje přídatek smáčedla MultiAD 0,1–0,2 l/ha.
	Bejlmorka kapustová Krytonosec šešulový	0,15–0,18 kg/ha, max. 1×	Proti <b>škůdcům šešulí</b> je neúčinnější ochrana ve fázi žlutých pupat, tedy asi 3–5 dnů před květem. V případě silnějšího výskytu šešulových škůdců nebo na počátku jejich výskytu se k dosažení delší reziduální účinnosti použije vyšší dávka uvedeného rozmezí. V tomto termínu aplikujeme i fungicidy s vysokou účinností proti hlízence AzoGUARD 1 l/ha. Vhodné stimulatory pro omezení stresu ze sucha a opadu šešulí jsou OilTOP 1,5 l/ha a SunGUARD 0,75 l/ha.
brambor	Mandelinka bramborová	0,06 kg/ha 400–600 l vody/ha, max. 1×	Termín aplikace je kdykoliv mezi I. až III. larválním stadiem. Účinnost přípravku po aplikaci je 3 týdny. Ošetření kombinujeme s listovou výživou CereaSTART 5–10 l/ha s vysokým obsahem fosforu. Vhodná ochrana proti očekávanému mrazu nebo slunečnímu úžehu je SunGUARD 0,75 l/ha.
+ MultiAD 0,1% Organosilikátové smáčedlo nové generace			<ul style="list-style-type: none"> <li>umožňuje snížit spotřebu vody bez snížení účinnosti postřiku</li> <li>podporuje účinnost, smáčlivost, přilnavost a penetraci účinných látek</li> <li>optimalizuje velikost kapek na 150–300 μm – redukuje úlet, zlepšuje pokryvnost a zasažení škodlivých organizmů</li> <li>zpomaluje vysychání postřikové kapaliny, důležité při teplotě nad 23 °C a nízké vlhkosti vzduchu</li> </ul>

### ŘEPKA OZIMÁ



### BRAMBORY



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

Jižní, východní a střední Čechy  
Západní a severní Čechy  
Východní Čechy a jižní Morava  
Střední a severní Morava

Jiří Šilha 724 336 184  
Kamil Štípek 602 359 904  
Martina Poláková 724 762 609  
Žaneta Hrnčířová 702 188 268

jsilha@soufflet.com  
kstipek@soufflet.com  
mpolakova@soufflet.com  
zhrncirova@soufflet.com