



MetazaGUARD

HERBICID DO ŘEPKY OZIMÉ A JARNÍ

Osvědčený selektivní herbicid k hubení jednoletých plevelů v řepce olejce v PRE i cPOST aplikaci, kdy se používá pro sólo aplikace nebo jako komponent do kombinací herbicidního ošetření. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení plevelů, ale vzešlé plevele ho přijímají částečně i listy.

PŘEDNOSTI

- Plasticita ošetření v PRE a POST termínu.
- Výborná selektivita k řepce bez ohledu na odrůdu.
- Za vlhka spolehlivá účinnost.
- Široké spektrum účinnosti, na svízel nutno posílit např. úč. I. clomazon.

Účinná látka: Metazachlor 500 g/l

Formulace: SC (suspenzní koncentrát)

Balení: 5 l

TERMÍN APLIKACE

- Přípravek se aplikuje preemergentně ve fázi plodiny BBCH 00–09 nebo postemergentně ve fázi BBCH 10–18.
- Při preemergentní aplikaci je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 15 mm půdy.
- Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevli a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé.
- Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je přípravek dobře snášen všemi odrůdami.


POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Řepka olejka	plevele jednoleté	1,5 l/ha	AT	1) od BBCH 30 do BBCH 32	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
Řepka olejka	100–400 l/ha	postřik	max. 1x za vegetaci

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
Řepka olejka	Nelze zkrmovat ošetřené plodiny přezývkavcům, kromě skotu.



OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI

- Do řepky ozimé neaplikujte na svažitých pozemcích (méně nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5 m.
- Do řepky jarní neaplikujte na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Lze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
- SPe3 ochranná vzdálenost od povrchové vody: řepka jarní 4–4–4–4, řepka ozimá 5–4–4–4.
- Neaplikujte tento přípravek nebo jiný s úč. l. metazachlor v celkové dávce vyšší než 1 kg úč. l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
- Nelze v OP II. st. zdrojů podzemní vody.
- Nelze v OP II. st. zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky jarní.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- Max. 1x za vegetaci.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI LZE KOMBINOVAT

- + Multifunkční smáčedlo MultiAD 0,1–0,2 l (pokryvnost, penetrace).
- + Herbicidy rozšiřující účinnost:
PRE – COMMAND CS 0,15–0,2 l/ha,
POST – GALERA PODZIM, BELKAR, GALERA.
- + Graminicid.
- + Insekticidy (EsfenGUARD).

Čechy

Jiří Šilha

724 336 184

jsilha@soufflet.com

Michal Konrady

602 359 904

mkonrady@soufflet.com

Morava

Martina Poláková

724 762 609

mpolakova@soufflet.com

Žaneta Hrnčířová

702 188 268

zhrncirova@soufflet.com

Tomáš Navrátil

601 101 934

tnavratil@soufflet.com