

CereaSTART

FERTEQ



KFV 1(C)(I)(b)(ii): VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI

PFC 1(C)(I)(b)(ii): VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

Roztokové hnojivo s obsahom fosforu, draslíku a hořčíku

Roztok hnojiva s obsahom fosforu, draslíka a horčíka

Živina	Živina	Hmotnostní % Hmotnostné %	Obsah živin Obsah živin
Fosfor (P_2O_5) vodorozpustný	Fosfor (P_2O_5) vodorozpustný	29 %	440 g/l
Draslík (K_2O) vodorozpustný	Draslík (K_2O) vodorozpustný	5 %	76 g/l
Hořčík (MgO) vodorozpustný	Horčík (MgO) vodorozpustný	6,7 %	100 g/l

Složky: kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*), hydroxid hořečnatý CAS: 1309-42-8 (KSM1*), chlorid draselný CAS: 7447-40-7 (KSM1*)

*KSM1: Látky a směsi z původního materiálu

Zložky: kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (CMC1*), hydroxid horečnatý CAS: 1309-42-8 (CMC1*), chlorid draselný CAS: 7447-40-7 (CMC1*)

*CMC1: Původné látky a zmesi



soufflet
agro



14,9 kg

10 L

CZ

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikace	Termin aplikace
Ječmen	3–5 l	1–3 x	od poloviny odnožování do začátku metání, pokud je potřeba lze opakovat s odstupem 10–15 dní
Pšenice	3–5 l	1–3 x	od poloviny odnožování do začátku metání, pokud je potřeba lze opakovat s odstupem 10–15 dní
Kukuřice	3–5 l	1–3 x	ve fázi 4–6 listů, pokud je potřeba lze opakovat s odstupem 10–15 dní
Řepka olejka	3–5 l	2 x	1. podzim – fáze 4–6 listů 2. jaro – začátek produkčního růstu
Cukrovka	3–5 l	1–3 x	ve fázi 4–6 listů, pokud je potřeba lze opakovat s odstupem 10–15 dní
Brambory	5 l	2–3 x	produkční porosty – od fáze tvorby hlíz
Hrách	3–5 l	1 x	možtecké porosty – do fáze tvorby hlíz při výšce hrachu 10–15 cm

Používá pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

ZPŮSOB APLIKACE: Příprava směsi: Pro lepší účinnost použijte optimální dávku vody na ha, aby ošetření listů bylo rovnoměrné a zároveň nedocházelo ke stékání postřiku. Doporučená dávka vody je 200 l/ha. Odměrné množství hnojiva najítte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníte na požadovaný objem. Připravený postřik aplikujte během několika hodin. Doporučujeme ošetřovat při teplotě 6 až 25 °C.

MÍSTELNOST: CeresSTART je směsátek v běžné používaných fungicidů a insekticidů a i celou řadou herbicidů, do směsi jej přimíchávejte až jako poslední. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test místelnosti. Lze bez problémů míchat s hnojivem DAM 390. V případě kombinací s jinými listovými hnojivy doporučujeme konzultaci s jejich výrobcem.

POMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skládat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivem.

NEBEZPEČÍ

H290 Může být korozivní pro kovy. **H302** Zdraví škodlivý při požití. **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranné šátek.

P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Oprávněné kůži vodou (nebo omyjte). **P305 + P351 + P338** Při zasažení Očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKU/lékaře. **P501** Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

LIVNIDACE: Nakládáte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Přemístěte do vhodného konteneru a zajištěte sběr odpadu specializovanou firmou pro zneškodňování odpadů.

POMKY PRO PRVNÍ POMOČ: Nečistě-li se po expozici obtížně nebo nepřetržitě-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústní. Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetřívá-li potíže, vyhledejte lékaře. **Při zasažení s kůží:** V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Jako preventivní ochranu použijte ochranný krém na ruce. Přetřívá-li potíže, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřené oči okamžitě vyplachovat vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut, vyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Vyhledejte očního lékaře. **Při požití:** Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávejte zvracení. Vyplachujte ústa vodou a vyptejte 1–2 dny. **HNED vyhledejte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření:** informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnutých první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i eventuelní následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informacním střediskem: **Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12808, Praha 2**, telefon nepřetržitě: **224 919 293 nebo 224 915 402**.

Na Bojišti 1, 12808, Praha 2, telefon nepřetržitě: **224 919 293 nebo 224 915 402**.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo výrobní řady: uvedeno na obalu

Výrobce: SOUFFLET AGRO a.s.,

Průmyslová 217/012, 796 01 Prostějov, ČR, Tel. +420 582 328 320

Původ zboží: AGRONUTRITION, Parc Actives-3 av de l'Orchidée,

31390 CARBONNIE, France

UF: X590-K07M-F00S-XF4E

SK

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikácia	Termin aplikácie
Jačmeň, pšenica	3–5 l	1–3 x	od polovice odnožovania do začiatku klasenia, ak je potreba možno opakovat s odstupom 10–15 dní
Kukurica	3–5 l	1–3 x	vo fáze 4–6. listu, pokiaľ je potreba možno opakovat s odstupom 10–15 dní
Repka olejná	3–5 l	2 x	1. jeseň – fáza 4–6 listov 2. jar – začiatok predĺžovacieho rastu
Cukrová repa	3–5 l	1–3 x	vo fáze 4–6. listu, pokiaľ je potreba možno opakovat s odstupom 10–15 dní
Zemiaky	5 l	2–3 x	produkčné porasty – od fázy tvorby hlíz
Hrach	3–5 l	1 x	možtecké porasty – do fázy tvorby hlíz pri výške hrachu 10–15 cm

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Nepřekročit příslušné dávkování.

POMKY PRE APLIKÁCIU: Príprava tank-mixu: Pre lepšiu účinnosť používajte optimálnu dávku vody na ha, aby ošetrenie listov bolo rovnomerné a zároveň nedochádzalo ku stekaniu postreku. Odporúčaná dávka vody je 200 l/ha. Odmerné množstvo hnojiva nalejte do nádrže postrekača naplnenej do polovice vodou a za stálého miešania doplníte na požadovaný objem. Pripravený postrek aplikujte počas niekoľkých hodín. Odporúčame ošetrovať pri teplote 6 až 25 °C.

MIESŤATELNOSŤ: CeresSTART je miesťateľný s bežne používanými fungicidmi a insekticidmi a aj celým radom herbicidov, do zmesí ho prímiešavajte až ako posledný. V každom prípade však odporúčame pred prvým použitím vykonať test miesťateľnosti. Možno bez problémov miesť s hnojivom DAM 390. V prípade kombinácií s inými listovými hnojivami odporúčame konzultáciu s ich výrobcami.

POMIEKNY SKLADOVANIA: Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať oddelene od jedla, nápojov a krmív. Uchovávať mimo dosahu potravín a nápojov vrátane potravín a nápojov pre zvieratá. Skladovacia teplota: 0–35 °C. Skladujte na suchom mieste.

NEBEZPEČENSTVO

H290 Může být korozivní pro kovy. **H302** Škodlivý při požití. **H314** Spůsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280** Nosíte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný šátek. **P303 + P361 + P353** Při kontaktu s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Oprávněné kůži vodou (nebo omyjte). **P305 + P351 + P338** Při zasažení Očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKU/lékaře. **P501** Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.

LIVNIDACE: Nakládáte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Odpad přemístěte do vhodného konteneru a zajištěte sběr odpadu specializovanou firmou pro zneškodňování odpadů.

POMKY PRE PRVÚ POMOČ: Ak sa prejaví zdravotné potiaže alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite informácie z bezpečnostného listu. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizačnej polohy na boku a dávajte pozor na príchodnosť dýchacích ciest. V prípade zvracania dávajte na postihnutého pozor, aby nedošlo k vyvrhnutiu zvratkov.

V prípade nadýchania: Vezmite postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade respiračnej poruchy vyhľadajte lekárske/lekársku službu. V prípade **požitia alebo zasiahnutia očí:** Okamžite vyplachujte 15 minút čistou vodou pri nasilu zdvihnutých viečkach. Bez ohľadu na počiatkové príznaky vyhľadajte lekára a ukážte mu etiketu. V prípade **zasiahnutia oděvu alebo zasiahnutia pokožky:** Okamžite si vyčistite zapažené alebo postriekané oděvy. Dávajte pozor na akékoľvek zbytky produktu, ktoré by mohli ostať medzi pokožkou a oděvom, hodinkami, topánkami, atď. V prípade ak je informované miesto rozšírené a/alebo je poškodená pokožka, je nutné vyhľadať lekárske ošetrenie a postihnuteľného po nemocnici. V prípade potíže: Postihnutého nepodávajte jedlo ani nápoje. V prípade potíže, pokiaľ je množstvo malé (nie väčšie, ako jedno prstennú), vyplachnite ústnu dutinu vodou, podajte postihnutému živočíšne útle a vyhľadajte lekárske ošetrenie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrúceho použite etiketu výrobku. Pri rozhodnutí poskytnúť informácie lekára, ktorý určí, či je potrebné ďalšie pozorovanie alebo nemocničná starostlivosť. Ukážte mu etiketu výrobku. **Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania:** informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutých prvých pomoci.

V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informacným centrom: Okamžite volajte **Národné toxikologické informačné centrum (Univerzitná nemocnica v Bratislave), Limbová 5, 833 05 Bratislava, 254 774 166** alebo lekára.

PRO PROFESIONÁLNÉHO POUŽÍVATEĽA

Datum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnéj řady: uvedené na obale

Výrobce: SOUFFLET AGRO Slovakia, s.r.o.

Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 036

Pôvod tovaru: AGRONUTRITION, Parc Actives-3 av de l'Orchidée,

31390 CARBONNIE, France

UF: X590-K07M-F00S-XF4E

3 349994 804155 >