

Pšenice ozimá

A

KWS DONOVAN

NASYPE, NEZKLAME, JE TO TA PRAVÁ

- Výborné registrační výsledky SDO v ČR – vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě, vysoká OH, N-látky, číslo poklesu a jeho stabilita
- Odrůda, která spolehlivě proměňuje investice do porostu v nadstandardní výnos
- Vhodná do technologií pro setí do širších řádků s nižšími výsevky – výborná kompenzační schopnost a produktivita klasu
- Odolnost vůči padlí či rzi plevové

TOP EFEKTIVNÍ ODRŮDA

Odolná proti stěblolamu – gen Pch1

ranost

POLOPOZDNÍ

rostliny

**STŘEDNĚ VYSOKÉ
(91 cm)**

HTZ

STŘEDNÍ (42 g)

zrno

STŘEDNĚ VELKÉ


odolnost k poléhání

DOBŘÁ

AGRONOMICKÉ DOPORUČENÍ:

- Vyšší nebo dělené dávky CCC v BBCH 22–30 + N hnojivo 10–15 kg + **CereaSTART**, 3 l/ha / **StimSTART** / **AstreaSTART** Trio 2–3 l/ha nebo **OligoSTART** 0,5–1 l/ha.
Husté porosty hlídat v BBCH 31–32 **MoGUARD** 0,15–0,2 l/ha a v BBCH 37–39 **EtheGUARD** 0,4–0,5 l/ha. Morforegulaci u středně hustých porostů provádět jen sníženými dávkami nebo vypustit. Husté a vitální porosty regulovat střední dávkou.
- Dle aktuálního stavu porostu ošetření listové plochy v BBCH 39–45 aplikujte **PyracloGUARD** 0,5–0,6 l/ha + **ProthioGUARD** 0,5 l/ha + **MultiAD** 0,1 l/ha.
Ošetření klasu proveďte spolu s ošetřením proti savým škůdcům. Ošetření klasu pomocí **MetproGUARD** 0,75–1 l/ha, které proveďte spolu s ošetřením proti savým škůdcům.
- Celkovou dávku 160–220 kg N/ha rozdělte do regenerační (50–70 kg), produkční (70–90 kg) a kvalitativní dávky (40–55 kg), přičemž v prvních dvou dávkách by měla být zahrnuta rovněž hnojiva se sírou.
- Pro zvýšení výnosu a N-l v BBCH 31 aplikujte **NitroFUSION** 0,5 l/ha, následně v BBCH 39–59 aplikujte **NitroTOP^{NG}** 10–20 l/ha.

ZDRAVOTNÍ STAV



Udržovatel: KWS LOCHOW GmbH; Registrace: ČR 2020

